



What

The cervix is the lower, narrow end of the uterus. Cervical cancer results when abnormal growth of cancer cells in the tissues of the cervix begin to develop.

How

Most cervical cancer is caused by Human Papillomavirus (HPV) which is a common sexually transmitted infection.

Symptoms

It is usually a slow-growing cancer that may not have symptoms in the early stages. Signs and symptoms of more-advanced cervical cancer include:

- Unusual bleeding in between periods
- Post-menopausal bleeding
- Vaginal discharge with unpleasant smell
- Bleeding after sex
- Pain or discomfort with sex



Risk Factors

- Many sexual partners. The greater your number of sexual partners and the greater your partner's number of sexual partners, the greater your chance of acquiring HPV.
- Having sex at an early age increases your risk of HPV.
- Other sexually transmitted infections (STIs). Having other STIs such as chlamydia, gonorrhea, syphilis and HIV/AIDS, increases your risk of HPV.
- A weakened immune system.
- Smoking.

Prevention

Getting screened regularly and acting quickly when symptoms appear greatly reduces your cervical cancer risks.



Go for regular pap tests every 3 years from age 20 to 65 years. Do you know when was your last screening?

Early Detection and Cancer Prevention Services

The Brunei Cancer Centre

For questions or concerns, please call us at
+673 261 3333 (ext. 1515)



Kanser Serviks

Apa

Serviks atau pangkal rahim ialah bahagian yang menyambungkan badan rahim ke faraj. Kanser serviks berlaku apabila terjadi pertumbuhan sel kanser yang tidak terkawal pada bahagian pangkal rahim.

Punca

Kebanyakan kanser serviks berpunca daripada Human Papillomavirus (HPV) yang merupakan jangkitan kelamin yang biasa dihadapi.

Tanda-tanda

Kanser serviks tumbuh secara perlahan yang mungkin tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Tanda dan gejala kanser serviks yang lebih lanjut termasuk:

- Pendarahan luar biasa di antara haid
- Pendarahan selepas putus haid
- Lelehan dari faraj dengan bau yang tidak menyenangkan
- Pendarahan selepas hubungan intim
- Sakit ketika melakukan hubungan intim



Faktor Risiko

- Mempunyai ramai pasangan seksual. Lebih ramai pasangan seksual anda dan lebih ramai pasangan kepada pasangan seksual anda, lebih besar risiko anda untuk mendapat HPV.
- Melakukan hubungan kelamin pada usia awal meningkatkan risiko mendapat HPV.
- Menghadapi jangkitan kelamin lain seperti *chlamydia*, *gonorrhoea*, *syphilis* dan HIV/AIDS, meningkatkan risiko mendapat HPV.
- Sistem imun yang lemah.
- Merokok.

Pencegahan

Mendapatkan ujian pap secara rutin dan bertindak dengan cepat apabila gejala muncul mengurangkan risiko kanser serviks anda.



Lakukan ujian pap setiap 3 tahun dari umur 20 hingga 65 tahun. Bila kali terakhir anda membuat ujian pap?

**Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser
Pusat Kanser Brunei**

Untuk pertanyaan, sila hubungi kami
+673 261 3333 (ext. 1515)